



INFORME SEMANAL

Período del 3 al 9 de abril de 2017

CITRICOS

Diaspinos

Continúan siendo relativamente elevadas las capturas de adultos de piojo rojo y blanco tanto en el Campo de Cartagena como del Valle del Guadalentín, aunque con un ligero descenso de esta primera generación anticipada. La proporción de formas sensibles es baja o muy baja en ambos casos, si bien hay cierta variación dependiendo de la zona y parcelas. En cualquier caso, se continúan observando en algunos casos larvas en las nuevas brotaciones, por lo que se recomienda realizar un control meticuloso de esta plaga, mediante el seguimiento de la presencia de formas juveniles (larvas) tanto en madera, como en los nuevos brotes y frutitos recién cuajados (muy escasos de momento).

Prays citri (limonero) y Cacoecia

Las capturas en trampa en ambas plagas son en general bajas a muy bajas en las plantaciones bajo control, algo más elevadas en el caso del prays en el Campo de Cartagena. No obstante, en algunos casos ya pueden observarse puestas dispersas de prays en los elementos florales, tanto en zonas del valle del Guadalentín como del Campo de Cartagena.

En cuanto al estado fenológico, aspecto importante a tener en cuenta de cara a la posible incidencia de estas plagas, en limonero se encuentra entre los estadios D-H, mientras que en naranjo y mandarino, estaría aún un poco más retrasado. El Campo de Cartagena se encuentra algo más adelantado con respecto al Valle del Guadalentín, mientras que otras zonas como Mula, estarían más atrasados que los anteriores.

Con estos niveles poblacionales y dado el estado fenológico actual, al menos de momento, estas dos plagas no suponen un problema importante. No obstante, como en otros casos, recomendamos mantener la vigilancia a partir de ahora conforme se vaya avanzando la floración y cuaje de frutos. En el caso de prays deberemos observar las puestas en elementos florales, mientras que en cacoecia se deben buscar los nidos en hojas o puestas en frutos jóvenes (hasta 3-4 cm de diámetro), para poder evaluar la situación en nuestras plantaciones.

Acaro de las maravillas

Las nuevas brotaciones son generalizadas en todas las zonas de producción, por lo que en caso de detectarse presencia de este ácaro en los controles que realicemos en los brotes tiernos (entre 5 y 7 cm de longitud) sería un buen momento para realizar tratamientos para su control, puesto que éste es el momento en el que los eriófidos abandonan las yemas viejas para desplazarse sobre estas nuevas brotaciones y colonizar las nuevas.

Araña amarilla

Situación similar a la semana anterior: Se detectan algunos focos dispersos activos (larvas y puestas) en el Valle del Guadalentín y Campo de Cartagena. En general, se viene observando la presencia de manchas en frutos "bigote". Por tanto, conviene mantener una vigilancia adecuada sobre la evolución de la plaga.

Pulgón

La presencia de pulgón tanto *Myzus* como *Aphis* continúa aumentando, encontrándose focos de pulgón en brotes (especialmente de *Aphis spiraecola*). De hecho, en algunas explotaciones los ataques comienzan a ser muy intensos y generalizados.



Brote de limonero afectado por pulgón



Hormigas cuidando una colonia de pulgón

Esta presencia es más notable en plantaciones cercanas a cultivos hortícolas (p.e. alcachofa o a campos en barbecho con abundante vegetación espontánea). Asimismo esta presencia es más notable y crítica en las nuevas plantaciones.

Dada las temperaturas que estamos teniendo en estas últimas semanas, deberemos estar atentos respecto a esta plaga, de cara a la realización de algún tratamiento en los focos que vayan apareciendo. No obstante como consideración general, debemos tener en cuenta que dado el largo periodo en el cual el pulgón va a estar activo en los cítricos, no es recomendable realizar tratamientos generalizados demasiado prematuros, dado que la presencia de esta plaga se va a prolongar bastante tiempo y a la posible actuación de enemigos naturales, siendo preferible tratar sólo los focos puntuales para evitar daños a esta fauna auxiliar, así como a las abejas, además de optimizar el número de tratamientos y los gastos que estos conllevan.

Mosca de la fruta

Desde hace semanas, se vienen registrando cero capturas de mosca.

Poda

En esta época muchos agricultores aprovechan para realizar una poda más o menos intensa o bien un aclareo de ramas. Esta operación puede venir muy bien para eliminar algunos focos de distintas especies de cochinillas, además de facilitar la aireación del árbol y la penetración de los tratamientos fitosanitarios que posteriormente puedan ser necesarios realizar sobre el cultivo.

Es muy importante que los cortes sobre el tronco o las ramas principales sean realizados de forma limpia y al ras, no dejando tocón y tratados con mastic cicatrizante o algún producto específico que sirva para prevenir infecciones de la madera o ataques de insectos que realicen perforaciones.




Detalle de cortes en tronco con aplicación de producto protector

Polinizadores y periodo de floración

En la mayoría de zonas de producción la floración de los cítricos ya ha comenzado o está muy avanzada, según variedades. Este es un momento muy esperado por los apicultores para colocar sus colmenas en las zonas donde predominan estos cultivos para la obtención de miel de azahar, la cual es muy valorada y cotizada por el mercado.



Floración en pomelo



Detalle de abeja en flor



De forma general, la actividad de estos apicultores es, en la mayoría de los casos, muy solicitada y bien recibida por la mayoría de agricultores, aunque también se da el caso contrario de forma puntual, principalmente cuando se cultivan ciertas variedades de mandarinas híbridas, sin semilla, donde la presencia de insectos polinizadores como las abejas, favorece la aparición de semillas en los frutos, lo cual no es nada deseable puesto que deprecia considerablemente la cosecha.

Dado que estas variedades no se cultivan en cotos cerrados o aislados, sino que por el contrario, se encuentran distribuidas al azar en las zonas productoras de cítricos, es conveniente que tanto apicultores como agricultores, adopten las medidas necesarias para evitar problemas para ambos. De este modo, se recomienda que los apicultores comuniquen a los agricultores de la zona donde van a establecer sus colmenas, con el fin de que estos a su vez, les puedan comunicar si alguna de sus variedades es del tipo antes explicado, con el fin de alejar la ubicación de las colmenas y evitarlos.

Además, por parte de los agricultores se debe evitar la realización de aplicaciones fitosanitarias al cultivo durante el periodo de floración y, en todo caso, si fuera imprescindible hacerlas, deberá elegirse un producto que no sea tóxico para éstas, además de realizar la aplicación en horas en las abejas ya no están trabando en la parcela (a partir del crepúsculo).

Actualmente, existe una enorme preocupación por el uso de fitosanitarios en la Agricultura y la supervivencia de estos insectos tan beneficiosos. Existen alternativas o formas de actuar que nos ayudan hoy día a producir una repercusión mínima sobre estos insectos tan beneficiosos y a la larga también sobre el equilibrio biológico en las plantaciones.

En nuestras manos está el ser respetuosos los unos con los otros y ejercer ambas actividades en sintonía lo cual será beneficioso para todos.

Caracoles

A partir de esta época, con noches relativamente húmedas y abundantes hierbas debido a las lluvias de estos últimos meses, pueden incrementarse los problemas con los caracoles. Además, en la medida se vaya aumentando el tiempo de riego, con el correspondiente incremento de zona mojada en superficie, pueden aumentar los problemas de esta plaga, por lo que debemos estar atentos a su presencia de cara a aplicar alguna medida para su control en caso necesario.

Los ataques son observados inicialmente en zonas bajas (falda) del árbol, aunque poco a poco van ascendiendo por las ramas superiores. Igualmente, debe tenerse en cuenta que, en los casos de arbolado joven, donde aún se mantiene el protector del tronco, los caracoles se resguardan en el hueco dejado entre el tronco del árbol y estos plásticos.



Daños producidos por caracoles

Formulados a base de Etofenprox

En la evaluación de los formulados a base de ETOFENPROX, se ha reducido considerablemente su uso en cítricos, perdiendo alguno de estos usos, como es el caso de *Prays* en limonero, quedando restringido su uso en cítricos a Mosca de la Fruta.

No obstante, el Ministerio de Agricultura ha dado un periodo de gracia para que los almacenes de venta y productores para que los mismos puedan gestionar y utilizar las existencias de los formulados fabricados anteriormente a este cambio normativo. De esta forma, se permite su venta hasta el 23 de junio de 2017, mientras que su uso queda autorizado hasta el 23 de diciembre de 2017.

FRUTALES

Pulgones

Aparecen nuevos focos de pulgones en las brotaciones de los distintos frutales de hueso y en especial en las plantaciones de almendro melocotoneros. En el caso de presentarse focos muy localizados de árboles solo deben tratarse estos.

Acaro de las agallas del ciruelo

Continúa la salida de adultos los cuales han pasado todo el invierno dentro de las agallas. Las nuevas agallas se formarán en la base de las nuevas brotaciones. En aquellos casos donde la presencia de agallas sea importante, será necesario realizar tres tratamientos, pues la salida suele prolongarse bastante tiempo.

Sila

Durante la última semana se ha detectado un incremento de poblaciones de adultos en las parcelas de peral. Al mismo tiempo se ha iniciado la puesta de 2ª generación. De momento se debe esperar a que evolucione la puesta de huevos de esta generación para realizar una intervención química.



Anarsia

Las capturas obtenidas en las distintas zonas de seguimiento continúan en aumento. Especial atención a plantaciones jóvenes donde los daños de larvas sobre brotes pueden ser más importantes. Los diferentes sistemas de confusión sexual presentan una eficacia bastante buena contra esta plaga. Aquellas parcelas que opten por estos sistemas deberían tenerlos colocados en estos momentos.

Gusano cabezudo

Aumento importantes de adultos en las parcelas de frutales. Aunque al principio solo se detectaban en las primeras filas de los bordes de las parcelas, su distribución por estas ya se está produciendo haciendo más difícil su control. Aunque de momento las temperaturas para iniciar el periodo de puesta no son las adecuadas, sería importante bajar las poblaciones de adultos.

Hoplocampa

Tanto en plantaciones de peral como de ciruelo se pueden observar daños producidos por larvas en frutos recién cuajados. En aquellas plantaciones donde la cosecha se haya quedado escasa es recomendable la realización de tratamientos inmediatamente, en aquellos donde sea abundante se pueden retrasar algunos días.

Autorización excepcional de Spinetoram 250 g/Kg (SC) contra psila en Peral

La Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria, perteneciente al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ha autorizado el uso la materia activa Spinetoram 250 g/Kg (SC) del 15 de abril al 12 de agosto de 2017, como insecticida contra psila. La dosis será de 0,4 kg. producto/ha; 0,8 Kg (tasa máxima total de aplicación por cultivo/temporada) El número máximo de aplicaciones por ciclo de cultivo es de 2, espaciadas al menos 28 días. El plazo de seguridad es de 7 días.

UVA DE MESA

Hilandero [=Lobesia botrana; =Polilla del racimo]

Inicio de capturas en alguna de las estaciones de control. Comprobado el retraso notable respecto al pasado año 2016 en las diversas estaciones de la misma zona.

Saltamontes

Se encuentran realizando la cópula y completando su alimentación. En las plantaciones de parral con malla, podría gestionarse la instalación y mantenimiento de mallas en las bandas, de forma que impidan la entrada de nuevos saltamontes desde el exterior, asegurando la continuidad de la barrera, evitando rotos o zonas sin malla.

Comprobamos la acción como fauna auxiliar de ciertas aves silvestres como el alcaudón que los ensarta en espinas y puntas de alambre. Los agricultores relatan otros casos: la merla caza individuos pequeños y también cazan el gavián, la cucala y la graja blanca. Así mismo mamíferos domésticos como el gato y aves domésticas como las gallinas de guinea.



Empoasca [=mosquito verde]

En diversas estaciones de control obtenemos algunas capturas de estas cicádulas en placas amarillas adherentes.

Araña roja

La eclosión de huevos de invierno de araña roja está completada en las muestras de control. Conviene revisar la eficiencia de los posibles tratamientos o la evolución en los brotes.

Melazo

Planococcus ficus es la especie de melazo presente en nuestros parrales. La importancia de este conocimiento radica en que, es posible utilizar técnicas alternativas de control de la plaga que están disponibles para esta especie, como es la confusión sexual. Este sistema permite confundir a los machos y evitar que fecunden a las hembras, reduciendo progresivamente la población de la plaga hasta niveles que no causen daños al cultivo y por tanto, no sea necesario el tratamiento químico contra ella. La utilización de este sistema además, es absolutamente compatible y puede ser combinado con el control biológico convencional, por medio de la suelta del parasitoide Anagyrus pseudococci, consiguiendo un control adecuado de la plaga sin los conflictos del uso de productos fitosanitarios que pueden surgir eventualmente, cuando las aplicaciones coinciden con el periodo de madurez o recolección de la fruta. En base a la duración de los difusores y al comportamiento de la plaga, parece más razonable colocar la difusión tras la 1ª generación, con el fin de cubrir los apareamientos que pueden tener lugar en la última generación en los meses de octubre y noviembre.

Oídio

No se debe descuidar la atención sobre oidio y conforme la brotación adquiere el desarrollo de 10-15 cm realizar las aplicaciones preventivas ya iniciadas en muchas explotaciones. Recordar que no es recomendable repetir varias veces la aplicación de una misma materia activa o productos de una misma familia química (triazoles, estrobilurinas, etc.) pues se puede producir la aparición de resistencias. El intercalar azufre entre un tratamiento sistémico y otro, ayuda a reducir o minimizar ese riesgo.

VIÑEDO

Hiladero [= arañuelo, = polilla del racimo]

Iniciada la captura de adultos en algunas zonas del Altiplano Jumilla-Yecla.

Restos de poda

Todavía se están realizando algunas podas extratardías. Recordamos la importancia de eliminar los restos de poda, preferentemente quemándolos, pero si no es posible y se recurre a la destrucción en el propio terreno, hay que conseguir trocear y triturar suficientemente los sarmientos y además, enterrar los restos troceados y triturados, para reducir la proliferación de plagas y hongos.



HORTALIZAS

Hortalizas al aire libre

Continúa subiendo la presión de varias especies de lepidópteros, lo que requiere una especial vigilancia en los cultivos más sensibles. En el caso de brócoli y otras brassicas, la oruga dominante puede ser *Plutella*.

Aunque es algo habitual en estas fechas, siguen incrementándose los focos de diferentes especies de pulgones, tanto los más polífagos, como *Myzus* y *Aphis*, como otros más específicos de determinados cultivos, tal es el caso de *Nasonovia* en lechuga y de *Brevicoryne* en brassicas. Junto a las colonias de esta plaga, es frecuente encontrar, cada vez más, presencia de insectos beneficiosos, como coccinélidos, crisopas y *Aphydius*. Aunque en muchos casos estos auxiliares no son capaces de controlar totalmente la plaga antes de que esta llegue a provocar daños importantes a la plantación, es muy importante trabajar solo con productos que sean compatibles con los mismos, lo que evitará que repunten los problemas de pulgones más adelante.

En los cultivos de cucurbitáceas, en estos momentos especialmente en los de invernadero, es importante prevenir las infecciones de oidio, desde las fases más tempranas de las plantaciones, con la ayuda de espolvoreos de azufre bien realizados. Los antioidios específicos se reservarán para cuando comiencen a detectarse los primeros síntomas de la enfermedad, iniciando sus aplicaciones antes de que ésta esté extendida. Incluso en variedades con resistencias a oidios, es importante la realización de algún espolvoreo de azufre y, de detectarse algún síntoma, de aplicaciones más específicas.

En algunas plantaciones de brócoli, especialmente del Valle del Guadalentín, se está detectando la presencia de la mosca blanca *Aleurodes brassicae*. Dada la importancia que adquieren diversos insectos beneficiosos en el control natural de esta plaga, es muy importante evitar los tratamientos fitosanitarios sobre estos cultivos que puedan resultar incompatibles con los auxiliares. De lo contrario, corremos el riesgo de encontrarnos con un importante problema con esta plaga en los próximos meses.

Melón y Sandía

No hay cambios importantes con respecto al estado fitosanitario de la semana pasada. Hasta el momento, en las plantaciones al aire libre de cucurbitáceas, no se ha detectado incidencia del virus del rizado del tomate Nueva Delhi (ToLCNDV). En estos cultivos se aprecian niveles poblacionales muy bajos de la mosca blanca *Bemisia tabaci*, y además se encuentran protegidos por mantas térmicas o films. No obstante, es crucial estar prevenidos ante este problema fitosanitario y seguir todas las recomendaciones que se están difundiendo por el Servicio de Sanidad Vegetal.

Pimiento de invernadero

Varias especies de pulgón, incluido *Macrosiphum euphorbiae* y *Aulacorthum solani* están incrementado su presencia, lo que debe vigilarse para intervenir en el caso de que la fauna auxiliar no fuera suficiente para su control.

La posible presencia de larvas de lepidópteros, en estos momentos fundamentalmente *Spodoptera exigua* y *S. littoralis*, debe vigilarse para evitar que se incrementen los focos.



Tomate

Se está detectando un cierto incremento de los niveles de la mosca blanca *Bemisia* en algunas zonas. Siendo importante controlar la plaga, lo es todavía más respetar la fauna auxiliar que debe ir instalándose en las plantaciones para frenar la presión de esta y otras plagas. Para ello, se recurrirá a los productos más compatibles con los auxiliares, especialmente con los míridos.

Igualmente se está produciendo un incremento en la presión de *Tuta*, fácilmente controlable con los productos más específicos y respetuosos con los insectos beneficiosos, siempre que se realicen aplicaciones de calidad y se posicionen adecuadamente los tratamientos. En la mayoría de casos, para poder romper el ciclo de la plaga, es necesario realizar secuencias de 2 tratamientos específicos, a los que seguirá alguno de *Bacillus*, con cadencias bien adaptadas al ciclo biológico de la plaga y productos a utilizar.

Prestar también una especial atención a los focos de araña roja, y presencia de sus depredadores, así como de focos de Vasate en las plantaciones.

En cuanto a enfermedades fúngicas, tan solo destacar la oidiopsis, que debe ser vigilada, interviniendo en los casos que fuera necesario.

Patata

En relación con las exportaciones de patata a Irlanda, recientemente se han establecido nuevos requisitos fitosanitarios, de cara a la posible presencia de *Epitrix*. Estas medidas van dirigidas a envíos de patata originarios de áreas distintas de áreas demarcadas (zonas con presencia de *Epitrix*) del territorio de los estados miembros. En concreto, estas medidas son obligatorias para poder realizar envíos desde zonas en la que no se ha detectado la plaga, e implican:

1. Notificación, a cargo del importador irlandés, de cualquier movimiento de patata originaria de estas zonas.
2. La patata procedente de estas áreas libres de *Epitrix*, deberá ir lavada de modo que no haya presencia de más de un 1% de suelo.

NOTA FINAL:

- Recordamos que en la página web de la Consejería mencionada anteriormente en la sección correspondiente a Sanidad Vegetal, se dispone de todos los informes anteriores del estado fitosanitario, así como de diversa información específica relacionada con algunos organismos de cuarentena, campañas de exportación, normas técnicas de Producción Integrada, registros de equipos fitosanitarios, entre otros.
- Para notificar cualquier incidencia o realizar consultas técnicas pueden dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico: sanidadvegetalmurcia@carm.es

Murcia, 11 de abril de 2017.