

Proyecto

18CLM1-3

**EVALUACIÓN Y DEMOSTRACIÓN DEL COMPORTAMIENTO VARIEDADES DE FLORACIÓN TARDÍA DE ALMENDRO EN LA COMARCA DEL ALTIPLANO**

<b>Área:</b>	AGRICULTURA
<b>Ubicación:</b>	Finca La Maestra, Jumilla (Murcia)
<b>Coordinación:</b>	Pedro Martínez Gil (Director CIFEJA Jumilla)
<b>Técnicos:</b>	N. Inés Trancón Blázquez, D. José Antonio Candel Quijada
<b>Duración</b>	2014-2024
<b>Financiación</b>	A través del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 2014-2020.



## Contenido

1. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS .....	3
2. PERFIL DEL POTENCIAL BENEFICIARIO FINAL DEL PROYECTO.....	4
3. ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN.....	4
4. ACTIVIDAD DE DEMOSTRACIÓN.....	4
4.1. Cultivo. ....	4
4.2. Ubicación.....	7
4.3. Superficie.....	7
4.4. Marco de plantación y densidad.....	8
4.5. Sistema de formación/entutorado.....	8
4.6. Instalación de riego. ....	8
4.7. Medios necesarios.....	9
4.8. Características del agua.....	10
4.9. Características del suelo.....	11
4.10. Datos climáticos. ....	12
4.11. Fases del proyecto.....	14
4.12. Diseño estadístico y control. ....	16
4.13. Plan de eficiencia medioambiental del proyecto.....	16
5. CALENDARIO.....	20

## 1. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS

El almendro tradicionalmente ha sido un cultivo marginal, propio de una agricultura de subsistencia, cultivándose principalmente en secano en condiciones de cultivo deficientes. Sin embargo, los altos precios de la almendra y sus perspectivas de continuidad, debido a una alta demanda, por encima de la oferta, están propiciando la extensión acelerada de su cultivo en suelos aceptables y en muchos casos, cuando hay disponibilidad de agua, cultivándose en riego localizado

Las variedades de Almendro cultivadas tradicionalmente en la Región son de excelente calidad (Marcona y Largueta) pero presentan el problema de tener una floración temprana, por eso su cultivo con fines comerciales ha estado restringido tradicionalmente a las zonas libres de heladas o con un peligro de heladas reducido.

Por otro lado tienen un alto grado de autoincompatibilidad, es decir, difícilmente se fecundan con su propio polen y necesitan el de otra variedad para producir cosecha (polinización cruzada). Lo que obliga al agricultor a cultivar en la parcela dos o más variedades de floración coincidente e intercompatibles y a la introducción de colmenas en la plantación. Con las variedades auto-incompatibles la polinización cruzada puede ser deficiente por diversas razones, como la falta de coincidencia en la época de floración de las variedades, la escasa o nula presencia de abejas polinizadoras, y por las condiciones meteorológicas desfavorables durante la floración (lluvia, viento, frío etc.)

En los últimos 30 años se han difundido mucho en España diversas variedades de floración tardía y, en muchos casos, autofértiles, obtenidas en programas de mejora desarrollados en Francia (INRA) y España (CEBAS, CITA e IRTA). Además también han perseguido otros caracteres como buena productividad, buena calidad del fruto (cáscara dura, ausencia de almendras dobles, buen aspecto del grano), facilidad de formación y poda del árbol, vigor suficiente (equilibrio entre crecimiento y producción), tolerancia a condiciones adversas (enfermedades, plagas, sequía).

El objetivo principal de este proyecto es contar con una parcela demostrativa de referencia en la zona del Altiplano para realizar la transferencia tecnológica de variedades mayoritariamente autofértiles, que permitan plantaciones monovarietales, con alto potencial productivo, baja sensibilidad a los problemas fitopatológicos de esta especie y de operaciones culturales (poda) menos costosas.

## 2. PERFIL DEL POTENCIAL BENEFICIARIO FINAL DEL PROYECTO.

Trabajadores y personas relacionadas con el sector agrario tales como agricultores, técnicos y estudiantes.

## 3. ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN.

Actuaciones	Si/No	Observaciones
1. Publicación Consejería		
2. Otras publicaciones		
3. Jornada técnica		
4. Acción formativa		
5. Memoria inicial proyecto.	Si	
6. Informes de seguimiento. Actividad demostración.	Si	
7. Informe anual de resultados. Actividad demostración.	Si	
8. Visitas a parcela demostración. Actividad demostración.		
9. Otras		

## 4. ACTIVIDAD DE DEMOSTRACIÓN.

El presente proyecto tiene como objeto evaluar el comportamiento agronómico y la adaptación a las condiciones climáticas de la comarca del Altiplano de un grupo de variedades autocompatibles de floración tardía. Las variedades se ensayan en condiciones de regadío y con riego restringido, aportando un 20-25% de las necesidades totales de la planta.

### 4.1. Cultivo.

En riego restringido se empleó el pie franco Garrigués, con las las siguientes características:

Resistente a caliza y sequía, prefiere suelos profundos y permeables, dan árboles vigorosos y longevos, son sensibles a asfixia radicular y enfermedades como Phytophthora, Agrobacterium, Armillaria, por lo que requiere suelos favorables en regadío.

En regadío se utilizó el híbrido GXN 15 o GARNEM, con las siguientes características:

Vigoroso, follaje rojo, induce productividad y precocidad de la fruta. Resiste Meloidogyne, sensible a Agrobacterium, tolera la clorosis férrica, no emite sierpes.

Las variedades que forman parte del proyecto son las siguientes:

- Vayro o Vairo: variedad del IRTA, no necesita polinización cruzada, buen nivel de autogamia (capaz de producir en condiciones de aislamiento), tardías (plena floración marzo), vigorosa, rápida entrada en producción, buena productividad, fácil poda y recolección. Rendimientos grano 29%, fácil pelado, cáscara dura sin frutos dobles (0,1%). Tolerante a “fusicoocum” y “mancha ocre”. Para favorecer la polinización cruzada, puede asociarse con “Constanti” u otras variedades de fecha de floración similar.
- Constanti: variedad del IRTA, autofértil, vigorosa, precoz, capacidad productiva alta, se adapta a seco, muy fácil poda, porte medio, buena aptitud para la recolección y facilidad de despellejado. Rendimiento del 27%, consistencia de la cáscara dura, porcentaje de almendras dobles prácticamente nulo (1,1%). Tolerante a la “mancha ocre” y sensible al “fusicoocum”. Para favorecer la polinización cruzada puede asociarse con “Vairo” u otras variedades de fecha de floración similar (“Glorieta”, “Francol”, “Guara”, etc).
- Marinada: variedad del IRTA procedente del cruzamiento “Lauranne” x “Glorieta”, autofértil, vigor medio y porte medio que permite marcos más estrechos, floración muy tardía (posterior a “Ferragnès”), muy productiva, poda muy fácil, buena aptitud a la recolección y fácil pelado, 31% de rendimiento, consistencia de la cáscara dura, sin frutos dobles (0,3%). Tolerante al “fusicoocum”. Para favorecer la polinización cruzada (práctica recomendable, incluso para las variedades autofértiles), puede combinarse en la plantación con “Tarraco”, que tiene una fecha de floración similar.
- Tarraco: variedad del IRTA, es auto estéril requiere polinización cruzada, va bien con Marinada, vigor medio permite marcos reducidos, muy precoz en entrada en producción,

capacidad productiva muy alta, poda muy fácil, buena aptitud para la recolección, 32% rendimientos, sin frutos dobles (0,1%). Tolerante a “fusisocum” y sensible a “mancha ocre”.

- Antoñeta: variedad del CEBAS-CSIC, vigorosa, porte abierto, florece con Ferragnés, autocompatible y autofértil, la introducción de colmenas favorece la producción, buen comportamiento en heladas tardías, cáscara dura, 35% de rendimiento, 0% de frutos dobles, almendra redondeada.
- Penta: variedad del CEBAS-CSIC, vigor medio, porte intermedio, extra-tardía, alta floración y producción, autocompatible, precoz en entrar en producción, fácil recolección, cáscara dura, 27% de rendimiento, 0% frutos dobles, para zonas donde Marta, Antoñeta o Guara se hielan.
- Soleta: variedad del CITA, árbol vigoroso, porte abierto, de fácil poda, tardía (finales febrero a marzo), cáscara dura, pepita similar a Largueta, fácil de cultivar y mecanizar.
- Belona: variedad del CITA, es un árbol vigoroso, abierto, de floración tardía (marzo), cáscara dura, buena productividad y fácil cultivo.
- Guara: variedad de floración tardía, vigor medio, rápida en entrada en producción, autocompatible, muy productiva, muy resistente al frío, buen rendimiento (37-40%), es una variedad de referencia.
- Ferraduel: variedad del INRA, árbol de porte medio, muy ramificado, vigor medio en regadío y escaso en secano, floración tardía, necesita polinización cruzada, maduración tardía, formación fácil, poda de fructificación costosa por la abundante ramificación, plantaciones preferibles en regadío.
- Francolini: variedad del IRTA, vigorosos, porte medio, formación y poda muy fácil, produce en ramilletes de mayo, floración tardía, auto fértiles y autocompatible, buen nivel de autogamia, abundante floración, precoz, muy productivo, almendra de cáscara dura y 30% de rendimiento.
- Masbovera: variedad del IRTA procedente del cruzamiento “Primorskiy” x “Cristomorto”, necesita polinización cruzada (siendo los polinizadores utilizados Glorieta”, “Francol”, “Ferragnès”), tardía (similar a “Ferragnès”), muy vigoroso característica que le permite mantener un buen equilibrio entre la producción y el crecimiento vegetativo, precocidad en

la entrada en producción media, capacidad productiva alta – muy alta, poda: muy fácil, buena aptitud para la recolección y fácil pelado, rendimiento al descascarado 28 %, sin frutos dobles dobles (0,4 %), Consistencia de la cáscara: dura. Tolerancia a la sequía y al “fusicoccum”.

- Glorieta: Variedad del IRTA procedente del cruzamiento “Primorskiy” x “Cristomorto”, necesita polinización cruzada (polinizadores “Francolí”, “Vairo”, “Constantí), Época de floración: tardía (similar a “Constantí”, “Francolí”, “Vairo”), muy vigoroso, precoz, Capacidad productiva muy alta, poda: muy fácil. Aptitud para la recolección: buena, fácil pelado, Rendimiento al descascarado: 29 %, Consistencia de la cáscara: dura, Porcentaje medio de almendras dobles: casi nulo (1,9 %). tolerante a la sequía.

#### 4.2. Ubicación.

El ensayo se encuentra situado el Centro de Demostración Agraria “La Maestra”, en la parcela 6 de coordenadas UTM (Huso-30) ETRS-89; 637.721/4.250.860.



#### 4.3. Superficie.

La superficie de la parcela demostrativa es de 6600 m<sup>2</sup>

#### 4.4. Marco de plantación y densidad.

El proyecto se desarrolla a un marco de 7x7 m, en una fila de 10 árboles de cada variedad 5 en regadío y 5 en riego restringido.

Esto supone un total de 130 árboles y una densidad de plantación aproximada de 200 árboles/ha.

El diseño experimental es el siguiente:

	Ferranuel	Vairo	Constanti	Marinada	Tarraco	Penta	Glorieta	Guara	Masbovera	Antoñeta	Soleta	Belona	Francolini
Riego restringido (franco)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regadío (G X N)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>camino</b>													

#### 4.5. Sistema de formación.

Los árboles están formados en vaso, se realizará poda de formación hasta la entrada en plena producción. Posteriormente se realizará anualmente una poda de mantenimiento/producción eliminando las ramas improductivas, etc.

#### 4.6. Instalación de riego.

Durante 2014, 2015 y 2016 se han tenido ambas subparcelas (riego normal y riego deficitario controlado) con una línea portagoteros y con solo gotero por árbol.

En 2017 los pies híbridos se riegan en riego normal aportando las dosis necesarias y el pie franco a un riego restringido, un 20 a un 25% de las necesidades totales de la planta.

#### Hibrido-(riego norma)

- Número líneas portagotos: 1
- Número goteros/árbol: 4
- Separación goteros: 1 m
- Caudal emisor: 4 l/h
- Tipo de gotero: Autocompensante

#### Franco-(riego restringido)

- Número líneas portagotos: 1
- Número goteros/árbol: 2
- Separación goteros: 1m
- Caudal emisor: 2 l/h
- Tipo de gotero: Autocompensante

#### 4.7. Medios necesarios.

La finca dispone de los medios necesarios para desarrollar el proyecto, tractor, aperos, instalación de riego (cabezal, programador, red de riego), también dispone de un técnico especialista que se encarga de las labores de riego y abono, laboreo, tratamiento fitosanitarios, las labores de poda y recolección se realizarán con personal externo especializado.

##### 4.7.1. Infraestructura.

- Nave-almacén
- Hangar para la maquinaria (150 M2)
- Estación agroclimática perteneciente al SIAM.
- Cabezal de riego
- Instalación de riego por goteo.
- Electrificación general.

- Tractor John Deere de 72 CV
- Atomizador Fielini modelo YA-90
- Embalse regulador de 11.000 m3
- Dos cabezales de riego independientes
- Red de riego.

#### 4.7.2. Suministros.

- Agua.
- Fertilizantes.
- Fitosanitarios.
- Combustible.
- Material de riego.
- Energía eléctrica.
- Herramientas

#### 4.8. Características del agua.

La parcela se riega con agua de pozo. El agua tiene una conductividad eléctrica de 2,1 ms/cm, pH de 8,17, sales totales de 1,42 g/l.

Sodio	192 mg/l	Ph	8,17
Potasio	8,5 mg/l	Conductividad eléctrica (25°C)	2,100 mS/cm
Calcio	118,8 mg/l	Boro	0,173 mg/l
Magnesio	88,9 mg/l	Sales solubles	1,42 g/l
Cloruros	296 mg/l	Presión osmótica	0,76 atm
Sulfatos	471 mg/l	Punto de congelación	-0,06 °C
Carbonatos	< 10,0 mg/l	Dureza	66 °F
Bicarbonatos	221 mg/l	Ph corregido (pHc)	-

Nitratos	23,7 mg/l	Carbonato sódico residual (C.S.R)	-9,63 meq/l
Nitrógeno Amoniacal	< 0,039 mg/l	Fosfatos	-


Fecha toma de muestra 13/10/2016

#### 4.9. Características del suelo.

El suelo donde se desarrolla el proyecto es un suelo arcilloso, con alto contenido en sales 0,80 ms/m y cloruros, tiene un pH de 7,25, contenido elevado en caliza activa 17,68% y bajos niveles de materia orgánica 1,43%. La parcela se encuentra a una altitud de 395 m.

PH en KCl 1M extracto 1/2 (v/v)	7,25	Potasio asimilable	0,85 meq/100g
Conductividad eléctrica.(25°C) ext. acuoso 1/5 (p/v)	0,840 mS/cm	Calcio asimilable	13,1 meq/100g
Cloruro sol. en extracto acuoso 1/5 (p/v)	1,36 meq/100g	Magnesio asimilable	4,38 meq/100g
Sulfato sol. en extracto acuoso 1/5 (p/v)	0,161 % (p/p)	Materia Orgánica	1,43 % (p/p)
Sodio	-	Carbono orgánico	0,827 % (p/p)
Sodio asimilable	2,06 meq/100g	Hierro asimilable	3,77 mg/Kg
Bicarbonatos	-	Boro asimilable	0,61 mg/Kg
Nitratos	-	Manganeso asimilable	4,6 mg/Kg
Fosforo asimilable	18,5 mg/kg	Cobre asimilable	1,16 mg/Kg
Potasio	-	Zinc asimilable	0,406 mg/Kg
Calcio	-	Caliza total	35,9 % (p/p)
Magnesio	-	Caliza activa	17,68 % (p/p)

Fecha toma de muestra 13/10/2016



**4.10. Datos climáticos.**



Se dispone de una estación meteorológica de la red SIAM (JU12) Cañada del Judío en el centro. Esta estación proporciona datos meteorológicos a tiempo real.



Nombre	JU 12, Jumilla (C <sup>a</sup> del Judío)
Coordenadas geográficas	Lat: 38° 2' 38,24'' Lon: 1° 58' 48,67''
Coordenadas UTM	X:637690 Y:4250801

Los datos medidos durante el periodo 1999-2017 se reflejan en la tabla siguiente:

Año	Tª Media (° C)	Tª Máxima (° C)	Tª Mínima (° C)	PP (mm)	HR Media (%)	Horas < 7 (h)	ETo (mm)
1999	15,79	29,73	1,02	253,4	60,46	1.279	1.269,69
2000	15,7	29,34	2,38	245,1	62,59	1.244	1.363,37
2001	16,08	28,95	1,23	330,2	64,38	1.188	1.335,17
2002	15,81	26,22	5,58	264,1	66,89	903	1.260,91
2003	16,21	29,53	1,27	196,1	65,74	1.057	1.272,99
2004	15,77	30,39	2,29	217,8	66,41	1.023	1.163,93
2005	15,27	29,57	-1,9	91,5	64,17	1.535	1.209,84
2006	16,65	29,31	-2,3	284,8	64,84	1.025	1.248,08
2007	16,11	29,08	1,97	286,8	61,65	1.095	1.250,19
2008	15,9	29,24	3,25	376,6	62,93	1.173	1.222,41
2009	16,52	31,73	-0,16	223,85	62,87	1.139	1.181,63
2010	15,44	29,24	0,87	305,1	66,28	1.328	1.168,76
2011	16,59	29,73	0,57	128,2	64,38	961	1.143,34
2012	16,44	32,67	0,97	288,4	56,88	1.305	1.330,34
2013	15,89	27,96	3,2	248,4	57,29	1.205	1.299,10
2014	17,16	28,58	2,54	192	54,7	763	1.415,98
2015	16,84	30,92	2,15	326,8	57,76	1.040	1.348,36
2016	16,77	31,14	5	303,4	57,87	733	1.328,31
2017	16,62	29,77	1,02	208,4	57,82	1.169	1.301,32



#### 4.11. Fases del proyecto.

##### 4.11.1. Preparación del suelo.

La preparación del suelo antes de la plantación consistió fundamentalmente en la eliminación de restos de cultivo anterior, laboreo profundo con subsolador y pase con fresadora.

#### 4.11.2. Plantación.

La plantación se llevó a cabo a yema dormida en enero de 2014, nos encontramos en el cuarto año. El proyecto se diseña para 10 años.

#### 4.11.3. Sistema de formación/poda

El sistema de formación de los almendros es el de vaso de 3-4 brazos.

Se colocaron tutores al inicio del cultivo, únicamente en los árboles que necesitaron ser reconducidos hacia la verticalidad.

Se realizará poda de formación hasta la entrada en plena producción. Posteriormente se realizará anualmente una poda de mantenimiento/producción eliminando las ramas improductivas durante la parada vegetativa del árbol.

#### 4.11.4. Riego y abonado.

El plan de riego de los almendros en pie híbrido con riego normal se diseña aportando la dosis necesaria, es decir adecuando las necesidades hídricas del cultivo en base a la evapotranspiración, la pluviometría y las características del suelo. Para ello se siguen las recomendaciones del SIAM.

El plan de riego de los almendros en pie franco, se diseña a un riego restringido, de un 20 a un 25% de las necesidades totales de la planta.

En la fertilización se siguen las recomendaciones del SIAM.

#### 4.11.5. Tratamientos fitosanitarios.

Seguimiento y control de plagas y enfermedades. En caso necesario se realizarán tratamientos fitosanitarios siguiendo las normas técnicas de producción integrada.

Se llevará a cabo un tratamiento de invierno con aceites minerales y cobre.

#### 4.11.6. Eliminación malas hierbas.

Control de flora adventicia; empleo de herbicidas y laboreo superficial primavera y otoño con cultivador.

#### 4.11.7. Análisis.

No se dispone de análisis.

#### 4.11.8. Recolección.

Se realizará la recolección en los meses de agosto/ septiembre.

#### 4.12. Diseño estadístico y control.

Las características más deseables en una variedad de almendro son:

- Autocompatibilidad; elimina la necesidad de polinización cruzada, permite plantaciones de una sola variedad facilitando el manejo y recolección (costes).
- Floración tardía; evita los posibles daños de heladas de primavera
- Ramificación poco abundante; árboles con buenas renovaciones y poco exigentes en poda.
- Calidad comercial; ausencia de semillas dobles, cáscara dura o semidura, abundante floración.
- Otras aptitudes; resistencia a plagas y enfermedades, fácil desprendimientos y descascarado, adaptación a distintos tipos cultivo,

La plantación se realiza en 2014, el proyecto se diseña para 10 años, los datos a estudiar se realizará de una muestra de los árboles de cada variedad tanto en regadío como en riego restringido, los datos a muestrear son:

- Producción.
- Estados fenológicos; fecha de floración (2 a 5% flores abiertas, 50% flores abiertas y 90% de flores abiertas), color de la flor y resistencia a heladas tardías. Fecha de maduración y recolección.

#### 4.13. Plan de eficiencia medioambiental del proyecto.

Uno de los principales objetivos en el centro es disminuir los residuos, el consumo de materias primas y mantener un uso eficiente de los recursos como el agua.

Para poder conseguir estos objetivos, es necesario elaborar un plan de ejecución y de medidas, entre las que encontramos las siguientes:

#### 4.13.1. Riego y abonados:

- Para evitar el consumo innecesario de agua, los riegos se realizarán a partir de programas de riegos realizadas teniendo encuesta los datos del cultivo y datos climáticos de la estación agroclimática existente en la finca.
- Se abonará siguiendo los criterios fijados en las normas de producción integrada, y cuando no existan por criterios técnicos y se tendrá en cuenta el estado del cultivo, los análisis de agua y suelo de la finca.
- En materia de nitratos se cumplirá el Código de Buenas Prácticas Agrarias. Para evitar contaminación de suelos y acuíferos por nitratos los abonados nitrogenados se realizarán con formas amoniacales u orgánicas, en el caso de abonados en forma nítrica estos se emplearan a bajas dosis y dosis asimilables por el cultivo para evitar su lixiviación.

#### 4.13.2. Flora y fauna.

- La finca se encuentra cercada por tanto inaccesible para especies de fauna como mamíferos, etc. Se respetaran los nidos de pájaros, madrigueras, etc. Cuando se realicen plantaciones en la finca tipo setos, jardinería, etc se realizarán con especies autóctonas de la comarca.
- Los tratamientos con agroquímicos se realizarán en condiciones climatológicas favorables para evitar la dispersión a zonas colindantes y que puedan afectar a la flora y fauna silvestre de la zona.

#### 4.13.3. Residuos.

- Se instalará en la finca contenedores para los diversos tipos de residuos (papel, vidrio, etc) que periódicamente serán llevados a contenedores municipales.
- Los residuos de envases de fitosanitarios serán depositados en los centros de la red SIGFITO más próximos.

#### 4.13.4. Contaminación atmosférica.

- Para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes atmosféricos (CO<sub>2</sub>, CO, NO<sub>x</sub>, O<sub>3</sub>, ect). La maquinaria a emplear en el proyecto se encontrará en perfecto estado de conservación, con las revisiones oficiales al día, etc. El

empleo del tractor para realizar laboreo del terreno se realizara bajos criterios técnicos, en los casos que sea posible se realizar desbroce en lugar del laboreo de menor demanda de potencia y consumo de energía y menor emisiones.

- Se evitará la quema de restos de poda con el compromiso de triturar e incorporar al terreno los residuos procedentes de las podas de los cultivos leñosos y otros restos vegetales, con el fin de reducir las emisiones de CO<sub>2</sub>.

#### 4.13.5. Consumo de energía.

- De cara a reducir el consumo de energía eléctrica se realizar una revisión anual de los equipos y el empleo de maquinaria eléctrica (bombas, etc) se empleara siempre bajo criterios de eficiencia energética.

#### 4.13.6. Fitosanitarios.

- Para disminuir el consumo de fitosanitarios y evitar la posible contaminación por los mismos sólo se realizarán cuando se supere el umbral de daños o de plaga recogido en las normas de producción integrada.
- Solo se emplearán productos recogidos en las normas de producción integrada, productos autorizados por el MAGRAMA, a las dosis autorizadas y siguiendo en todo momento las normas del fabricante.
- Se emplearán las materias activas de menor categoría toxicológica, de menor persistencia en el medio ambiente y de menor peligro para el medio ambiente. Así mismo las materias activas se rotaran para evitar resistencias. Además a la hora de realizar el tratamiento se tendrá en cuenta los posibles daños a abejas, etc.
- Los tratamientos se realizarán por personal cualificado, con los equipos de protección adecuados y con maquinaria en perfectas condiciones (ITEAF, etc.). Se evitara tratar en días con viento, lluvia que dispersen las aplicaciones.
- A la hora de realizar tratamientos herbicidas estos solo se realizarán estrictamente cuando sean necesarios, con productos recogidos en las normas de producción integrada.

#### 4.13.7. Prevención de la erosión de suelos.

- Se establecerán fajas o franjas vegetales en con una anchura mínima de 1 - 1,5 m, en recintos con pendiente media igual o superior al 5%-10%, o bien obras permanentes de conservación de suelos (terrazas, abancalamiento, etc.).
- Se corregirán mediante obras de conservación de suelos los surcos profundos y cárcavas que puedan producirse.
- Los restos de poda se triturarán e incorporarán al terreno así como otros restos vegetales, para favorecer la conservación de suelos.
- Reducir al máximo el número de labores y profundidad de las mismas, siguiendo siempre criterios técnicos.
- Se mantendrá los niveles de materia orgánica a un mínimo del 1% en secano y 2% en regadío, para preservar una correcta estructura del suelo



## 5. CALENDARIO

Fase del proyecto	Año	En	Fb	Mr	Ab	My	Jun	Jul	Ag	Sp	Oc	Nv	Dc
<b>Actividad de divulgación</b>													
Publicación Consejería	2018												
Jornada técnica	2018												
Actividad demostración. Informe inicial.	2017												
Actividad demostración. Informes de seguimiento	2018												
Actividad demostración. Informe anual de resultados.	2018												
Actividad demostración. Visitas a parcela demostración.	2017/2018												
<b>Actividad de demostración</b>													
Laboreo y abonado (secano)	2018												
Riego, abonado y control flora adventicia	2018												
Seguimiento y control de plagas	2018												
Poda	2018												
Recolección	2018												

**VAYRO**



Fuente: IRTA



CONSTANTI



Fuente: IRTA



MARINADA



Fuente: IRTA



TARRACO



Fuente: IRTA



**ANTOÑETA**



Fuente: CEBAS



**PENTA**



Fuente: CEBAS

**FERRADUEL**



Fuente: Viveros Jodar



**FRANCOLINI**



Fuente: IRTA



MASBOVERA



Fuente: IRTA



**GLORIETA**



Fuente: IRTA

