

TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS

Definición

Un recinto confinado es cualquier espacio con aberturas limitadas de entrada y salida y ventilación natural desfavorable, en el que pueden acumularse contaminantes tóxicos o inflamables o tener una atmósfera deficiente en oxígeno y que no está concebido para una ocupación continuada por parte del trabajador.

Los accidentes en estos espacios, en su mayoría mortales por falta de oxígeno, tienen lugar por no reconocer los riesgos presentes, ocurriendo un 60% de las muertes por este motivo durante el auxilio inmediato a las primeras víctimas.



1 Instrucción al trabajador para la identificación del espacio confinado y la toma de conciencia de los riesgos y su prevención.
No entrar sin autorización previa.



2 Limpieza, medición y evaluación del ambiente interior, por personal cualificado, para determinar su peligrosidad.



3 Cumplimentación de la autorización de entrada y adopción de las medidas preventivas.



4 Entrada en las condiciones establecidas y con medios y equipos adecuados (ventilación suficiente, protecciones personales, escalera, cuerda de salvamento sujeta desde el exterior, etc.).



5 Control desde el exterior de la situación durante todo el tiempo de trabajo, con medición continuada de la atmósfera interior.



6 Adiestramiento y planificación frente a un eventual rescate o emergencia.

Lugares más frecuentes

- CISTERNAS Y POZOS
- FOSAS SÉPTICAS
- ALCANTARILLAS
- SOTANOS Y DESVANES
- CUBAS Y DEPÓSITOS
- REACTORES QUÍMICOS
- BODEGAS DE BARCO
- FURGONES
- SILOS
- ARQUETAS SUBTERRÁNEAS
- TÚNELES
- DESGUACE BARCOS Y FUSELAJES
- CONDUCTOS AIRE ACONDICIONADO
- GALERÍAS DE SERVICIOS
- FOSOS

Motivos de acceso

- CONSTRUCCIÓN
- REPARACIÓN
- LIMPIEZA
- PINTURA
- INSPECCIÓN
- RESCATE
- ETC.

Riesgos generales

- APRISIONAMIENTO
- ELECTROCUCIÓN
- CAIDAS
- RIESGOS POSTURALES
- PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN
- AMBIENTE FÍSICO
 - FRÍO Y CALOR
 - RUIDO
 - VIBRACIONES
 - ILUMINACIÓN

Riesgos específicos

Asfixia

El aire contiene sobre un 20% de oxígeno. Si éste se reduce al 18% pueden producirse ya síntomas de asfixia. A niveles del 10-14% y en pocos segundos los efectos pueden ser graves, llegando incluso a la muerte.

Las causas más frecuentes de esta disminución de oxígeno son por: consumo del mismo debido a fermentaciones, oxidaciones, combustión, respiración, etc., o desplazamiento del aire por otros gases tales como argón o anhídrido carbónico.

Incendio o explosión

Si se aporta un foco de ignición, los vapores inflamables o polvos combustibles a concentraciones superiores al 20% del límite inferior de inflamabilidad, así como el aumento de oxígeno en el aire, pueden originar un incendio o explosión.

Las causas de ello pueden ser: evaporación de disolventes, carga y descarga de cereales, focos caloríficos, enriquecimiento de la atmósfera en oxígeno, etc.

Intoxicación

La concentración de productos tóxicos por encima de los límites de exposición permisibles puede producir intoxicaciones o enfermedades.

Las causas pueden ser: por fugas de productos químicos en procesos industriales, operaciones de limpieza, descomposición de productos orgánicos, etc.

Recuerda

En caso de accidente, si no dispones del equipo y la instrucción necesaria, no prestes auxilio, solicita ayuda a los equipos de emergencia.

Si desea obtener más
Información sobre TRABAJOS EN
ESPACIOS CONFINADOS puede dirigirse al
Instituto de Seguridad y Salud Laboral
C/ Lorca, 70 • EL PALMAR • 30120 Murcia
Telf.: 968 36 55 00 • Fax: 968 36 55 01.
www.carm.es/issl
issl@carm.es



TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS

